

---

# HISTAVERIN

## JARABE



### COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contienen:

Codeína fosfato (D.C.I.) 0,2 g; Exc.: citrato sódico dihidratado, mentol, sacarosa, parahidroxibenzoato de metilo (E 218), ácido cítrico monohidratado, color verde menta (E 102), esencia de limón, etanol 8,08 ml y agua purificada.

### ACCIÓN

El principio activo del HISTAVERIN, el fosfato de codeína, es un antitusígeno que actúa centralmente para suprimir la tos.

### INDICACIONES

Tratamiento de la tos improductiva en procesos tales como: gripe y resfriados, tosferina, laringitis, laringotraqueítis, enfisema, neumonía, pleuritis, neuromoconiosis, tuberculosis.

### POSOLOGÍA

Adultos: 2 cucharaditas 3 ó 4 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita 3 ó 4 veces al día.

Niños de 2 a 6 años: ½ cucharadita 3 ó 4 veces al día.

En general, salvo criterio médico, no se recomienda en niños menores de 2 años.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Depresión respiratoria. Ataques agudos de asma y bronquitis.

Prematuros y recién nacidos.

Enfermedades hepáticas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

### PRECAUCIONES

Se administrará con precaución a ancianos y pacientes debilitados con las funciones hepáticas, cardíaca o renales alteradas, así como en casos de hipotiroidismo, hipertrofia prostática, colitis ulcerativa crónica y enfermedades que cursan con disminución de la capacidad respiratoria.

La codeína puede producir somnolencia, por lo que debe tenerse presente si se han de conducir automóviles o maquinaria.

Embarazo y lactancia: No debe administrarse durante el embarazo a menos que a juicio médico los beneficios superen los riesgos potenciales. Es aconsejable interrumpir la medicación durante la lactancia.

### INTERACCIONES

La codeína puede potenciar el efecto sedante de los depresores del sistema nervioso central como ansiolíticos, antisicóticos, antihistamínicos y alcohol.

El uso simultáneo de anticolinérgicos y codeína puede ocasionar obstrucción intestinal. La administración simultánea de codeína e inhibidores de la MAO o antidepresivos

tricclicos puede potenciar los efectos de ambos.

Algunos fenotiacinicos aumentan la analgesia inducida por codeína, mientras que otros la disminuyen.

### **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Ocasionalmente pueden aparecer estreñimiento, náuseas y somnolencia que cesan al suprimir la medicación. La administración de dosis elevadas y a largo plazo puede ocasionar dependencia y/o depresión respiratoria.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de intoxicación por sobredosificación deben practicarse las medidas hospitalarias habituales de desintoxicación (lavado gástrico o eméticos; corrección de la depresión respiratoria, especialmente con el antagonista naloxona, 2 mg i.m. o i.v. en forma de bolus).

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20

### **ADVERTENCIAS**

Cada 5 ml (una cucharadita) de este medicamento contienen 3,5 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

Por tener etanol como excipiente puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia y en mujeres embarazadas y niños.

Esta especialidad lleva como excipiente el colorante E 102 lo que puede ser causa de reacciones de tipo alérgico, incluido asma bronquial, en determinados individuos, especialmente a los sensibles al ácido acetilsalicílico.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

### **CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN**

El frasco debe protegerse de la luz.

### **PRESENTACIÓN**

Frascos de 100 y 250 ml.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera  
del alcance y de la vista de los niños**

**Con receta médica.**

**El fosfato de codeína es el único antusígeno incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1997**

---

### **LABORATORIO ESTEDI, S.L.**

Especialidades terapéuticas y diagnósticas.

Montseny, 41 y Leopoldo Alas, 7

08012 - BARCELONA

HV-0502