
TEDIPRIMA



Cápsulas - Suspensión
Antibacteriano

Modernos estudios clínicos han demostrado la eficacia antibacteriana de la trimetoprima, usada como medicación única. Su excelente tolerancia permite su administración durante períodos prolongados, lo cual tiene especial importancia en algunos tipos de infecciones, como por ejemplo, las genitourinarias, cuya tendencia a recidivar constituye una fastidiosa carga para el paciente y el médico.

En las infecciones urinarias agudas, investigadores alemanes han mostrado que si bien se observa una igualdad terapéutica entre la trimetoprima sola o asociada al sulfametoxazol, los efectos secundarios son inferiores con la trimetoprima sola, por lo cual este tratamiento es preferible.

Otros investigadores han experimentado con excelentes resultados la trimetoprima simple en infecciones respiratorias.

La trimetoprima es un potente inhibidor selectivo de la dihidrofolato reductasa bacteriana y «constituye un descubrimiento mayor, con posibilidades terapéuticas de gran alcance».

COMPOSICIÓN

Cápsulas: Cada cápsula contiene trimetoprima (D.C.I.) 160 mg; Exc.: celulosa microcristalina, sílice coloidal, talco y estearato magnésico.

Componentes de la cápsula: gelatina, amarillo de quinoleína (E 104), dióxido de titanio (E 171).

Suspensión: Cada cucharadita (5 ml) contiene trimetoprima (D.C.I.) 80 mg; Exc.: celulosa microcristalina, parahidroxibenzoato de metilo (E 218), carboximetilcelulosa, sacarina sódica, sorbitol, polisorbato 60, aroma y agua purificada.

INDICACIONES

Infecciones bacterianas grampositivas y gramnegativas sensibles a la trimetoprima, en especial infecciones genitourinarias y respiratorias.

POSOLOGÍA

Adultos

Dosis usual: Dos cápsulas al día, una cada doce horas. En algunos casos es conveniente iniciar el tratamiento con tres cápsulas al día, una cada ocho horas.

La dosis de mantenimiento para largo tiempo puede ser tan baja como de una cápsula al día.

Niños

De 6 a 12 años: Dos cucharaditas al día, una cada doce horas.

De 3 a 6 años: Dos medias cucharaditas al día.

De 1 a 3 años: ½ cucharadita al día.

Adultos

Dosis mínima: Una cápsula al día.

Dosis media: 2-3 cápsulas al día en 2-3 tomas.

Dosis máxima: 4 cápsulas al día en tres tomas.

Niños

Dosis mínima: ½ cucharadita al día.

Dosis media: Dos cucharaditas al día.

Dosis máxima: Tres cucharaditas al día.

CONTRAINDICACIONES

Todos los preparados que contienen trimetoprima se hallan contraindicados en la anemia megaloblástica y en afecciones hepáticas graves.

A pesar de que la trimetoprima se ha administrado a muchas embarazadas sin ningún efecto sobre el feto, se desaconseja su utilización en este estado, y, especialmente, durante los primeros meses. Se desaconseja asimismo en madres lactantes.

La trimetoprima se halla contraindicada en prematuros y niños menores de dos meses.

En pacientes con insuficiencia renal debe administrarse con cautela.

En tratamientos prolongados, vigílese la fórmula hemática.

INCOMPATIBILIDADES

No se conocen.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Pueden presentarse aunque muy raramente, náuseas, gastritis y leucopenia. La tolerancia a la TEDIPRIMA es, en general, óptima.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Dosis altas de trimetoprima pueden ocasionar náuseas, vómitos y diarreas que desaparecen espontáneamente.

En la intoxicación crónica puede presentarse depresión de la hematopoyesis debida a la interferencia del medicamento en el metabolismo del ácido fólico. Esta interferencia puede corregirse fácilmente con inyecciones de folinato cálcico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

ADVERTENCIAS

Advertencia sobre excipientes:

Suspensión : Este medicamento contiene 1,75 g de sorbitol como excipiente por 5 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN

Las habituales. No requiere condiciones especiales.

PRESENTACIÓN

Envase de 16 cápsulas.

Frasco de 100 ml.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera
del alcance de la vista de los niños.**

Con receta médica.

LABORATORIO ESTEDI, S.L.

Especialidades terapéuticas y diagnósticas

Montseny, 41 y Leopoldo Alas, 7

08012 - BARCELONA

TR-0502